

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 21-5-69 929757

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

5, Place Paul Jamot - 51-REIMS - Tél. 47.22.87

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W
Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

SUPPLEMENT N° 3 AU BULLETIN N° 104 DE MAI 1969

16 mai 1969/n°17

VIGNE

INFORMATIONS

Rougeot parasitaire ou Brenner :

En raison de la pousse rapide observée ces derniers jours, nous renouvelons notre avis du 7 mai et conseillons, selon les cas, l'application ou le renouvellement d'un traitement, en fonction du stade végétatif atteint dans les différents vignobles. Dans tous les cas, l'apparition de trois nouvelles feuilles justifie une nouvelle intervention.

Pyrale de la vigne :

La sortie des jeunes chenilles a été observée dans de nombreux vignobles. Un traitement insecticide doit donc être appliqué, surtout dans les cépages blancs.

Erinose :

Cet acararien s'est manifesté dans divers secteurs. L'addition d'un soufre mouillable aux bouillies visant soit le rougeot soit la pyrale est recommandée.

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS

Tavelures du pommier et du poirier :

Les températures élevées de ces derniers jours ont provoqué une pousse importante des arbres ainsi que l'extériorisation de taches de tavelure. Celles-ci représenteront pour le nouveau feuillage une source d'infestations graves au cours des prochaines pluies. A l'heure actuelle, il faut chercher à assurer une protection du verger en effectuant le traitement préventif nécessaire, aussi près que possible de la future période pluvieuse.

.../...

Dans quelques vergers, la présence de taches de tavelure assez nombreuses nous amène à recommander outre le traitement préventif, une intervention rapide dès la fin de la prochaine pluie (traitement d'arrêt) surtout si la végétation est restée humide plusieurs heures, après une précipitation nocturne par exemple.

Nous rappelons que les risques de contamination par ascospores existent toujours.

INFORMATIONS :

Oïdium du pommier :

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables à l'extension de ce champignon.

Pucerons verts - Pucerons mauves du pommier :

De petits foyers existent dans les vergers ; l'emploi d'un insecticide systémique doit permettre la destruction de ceux-ci.

Araignées rouges : Panonychus ulmi

L'éclosion des pontes hivernales a été accélérée cette semaine. Dans les vergers contaminés, un traitement est conseillé dans la dernière semaine du mois de mai.

Les Contrôleurs chargée des
Avertissements Agricoles.

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytopsanitaire "CHAMPAGNE"

R. PARIS - H. de MEIRLEIRE

J. DELATTRE.